Raport d'une observation Communiquée a l'academie, par
Monsieur delamotte chirurgien a soulange près d'auxerre.

Cette observation a pour objet une hernie complette dont le nommé leonard galleraux vigneron etait attaqué depuis 26 ans, Monsieur delamotte dit que la longueur du tems avait formé une adherance, et excroissance, qui avait uni l'intestin avec les vaisseaux Spermatiques, et le testicule droit: de manière que le tout paraissoit n'être qu'un Seul et meme corps. il me fut jmpossible d'en faire la Separation, la matiere qui S'ecoulait par l'intestin avec trop d'abondance S'y durcit, et cette dureté en Rendit la Rentrée jmpraticable, l'intestin et les teguments Se Sont trouvés meurtris par les efforts reiterés du malade. il Sest formé des engorgemens Suivis d'inflamation, de vomissement de matiere Sterorale, et de Sueur froide; et le poulx devenait convulsif, la tumeur Se terminant un peu en pointe pouvait avoir dix pouces de circonferance; les bourses etaient extrémement enflamées, et tendües. ces Symptômes me firent Soupçonner de la gangrène a l'intestin. tel etait l'etat du malade lorsque je fus appelé qui etait le 22: 9bre. 1752.

Monsieur delamotte avoüe que tous les Symptômes enoncés cy dessus luy firent Soupconner la gangrène a l'intestin, et malgré cela il ne Se decida pas pour faire l'operation. nous croyons qu'il n'en fallait pas de plus graves pour Se decider a la faire, Sans attendre que la mortification augmentât. j'apliquay dit l'autheur Sur la tumeur des cataplasmes emolients, Six jours apres je trouvay la tumeur ouverte vers Sa pointe, et le reste en etait gangrené: je coupay tout ce qui me parut l'etre, en prenant de bas en haut jusqu'a l'anneau, il Sortit par l'insision une grande quantité de matiere Sterorale meslée d'une liqueur gluante de couleur jaune et brun, d'une odeur foetide et insurportable.

Si monsieur de la motte n'eut pas differé l'operation, il aurait pu eviter la grandeur de cette maladie. nous ne Saurions approuver une telle conduitte, car Si l'operation avait été faite a tems il aurait peutêtre pu conserver le testicule qu'il a été obligé de couper, Monsieur delamotte tanta jnutilement de Separer l'intestin d'avec le cordon Spermatique, et le testicule, l'adherance etait Si intime qu'il ne put y parvenir; et d'ailleurs ces deux dernieres parties etoient presque toute gangrenées. Monsieur delamotte dit que pour S'opposer a une rentrée Subite de l'intestin dans l'abdomen, il fit une ligature, a un pouce de l'anneau; et qu'apres cette ligature faite, il emporta tout ce qui etait gangrené. le testicule

ARC
carton 34
n°. 40

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Etait d'une grosseur prodigieuse, il louvrit et trouva sa substance seiche et de couleur noire; il coupa environ six pouces de lintestin, et pansa la playe avec un digestif animé, apres l'avoir lavée avec une lotion composée. l'auteur ne devait pas craindre la rentrée des parties dans le bas ventre puisquelles avaient contracté des adhérances avec l'anneau ce dont il aurait été instruit s'il eut cherché a savoir ce qui se passait du costé de l'anneau, c'est ce que tous les gens de l'art doivent faire apres lincision faite, car il arive souvent que les parties qui ont formé les hernies anciennes contractent des adhérances avec l'anneau soit interieurement, ou exterieurement, et cela s'apperçoit aisément par la resistance qui s'oppose a la rentrée des parties; on s'en apperçoit même sans faire d'operation, et dans ce dernier cas on en fait rentrer ce qu'on peut, et on maintien le reste par le moyen d'un bandage creux, qui est seulement contentif; et ce moyen suffit quand il n'y a pas d'accidens qui exigent l'operation; et quand au contraire les parties n'ont pas contractés d'adhérance avec l'anneau dans le cas ou l'on a fait l'operation, il faut faire la ligature comme elle a été pratiquée par feu Monsieur de la peyronie raportée dans le premier volume de cette academie ainsi que par d'autres observations, qui ont été faites depuis ce tems. l'auteur dit qu'apres une suppuration de trois semaines, il eut le plaisir de voir tomber de soy même tout ce qui restait de gangréné, mais il fut effrayé de la chute de la ligature jusqu'a l'anneau attendu qu'il en sortait une grande quantité de matiere stercorale avec de grands vers. a legard des vers cela ne doit pas surprendre, ils pouvaient être dans le canal intestinal: il y a beaucoup d'observations ou l'on raporte qu'il est sorti des vers dans des abcès et ulceres a l'aine; c'est ce qu'on peut voir dans les observations de medecine de la société d'edinbourg tome premier.

Mais a legard de la sortie des matieres stercorales dont Monsieur de lamotte fut effrayé cela venait de ce que la ligature n'avait pas été faite au dessous de la partie gangrénée de l'intestin, puisqu'il s'est trouvé ouvert. le malade a grande obligation a l'adhérance, car sans elle les matieres se seraient epanchées dans le ventre, et le malade aurait perit faute de n'avoir pas fait la ligature plus bas, et de n'avoir pas pris une portion du mesentaire dans l'ance comme il est dit dans le memoire de Monsieur de la peyronie. l'auteur dit qu'il fut tenté de prevenir l'evacuation de la matiere par l'anneau, et pouvoir fermer le passage, il imagina de faire quelques legeres scarifications qui devaient naturellement procurer la reunion des chairs, mais il eut peur que cela ne

causât ledetachement, et la Rentrée de lintestin. nous pensons quil a tres bien fait denpas executer son jdée comme ses confreres luy ont conseillé. Monsieur dela motte a continué de panser le malade pendant quatre mois, et il est enfin gueri; il ne luy reste plus que louverture de lanneau, qui sert enpartie de second anus, il rend par cette ouverture cequil ya dexcremens deplus fluides, et leplus grossier suit la Route ordinaire. depuis ce tems il fait porter un Champignion au malade lequel sen trouve bien.

Nous Estimons que la presente observation poura être mise par extrait dans nos memoires affin de confirmer deplus enplus laguerison des hernies avec gangrène, et pour faire voir les ressources que la nature a pour seconder les maitres de lart.

La seconde observation de Mr. delamotte a pour objet une loupe connüe sous le nom de mellicerís dont une femme etait attaquée au genou droit et quelle portait depuis 20 ans; sa grosseur etait si monstreuse quelle ne pouvait marcher quavec peine; lauteur dit quil la trouva ouverte dans sa partie inferieure laterale externe; et que cette ouverture permetait lentrée dun moyen bourdonet, et avait donné issüe a une grande quantité de matiere de couleur de miel cequi effraya la malade a nepoint permettre a Mr. delamotte den faire lamputation, comme il luy avait proposé plusieurs fois. jenepu la panser quavec quelques bourdonnets attachés avec un fil, trempés dans du vin chaud, en attendant quelle fut revenüe de sa frayeur. par la suitte M. delamotte emporta un Kiste dela grosseur dun oeuf depoule dinde, il en restait encore un, la famille nevoulut pas permettre a M. delamotte delemporter, attendu la foiblesse dela malade. laplaye fut pansée avec undigestif animé, avec differentes drogues, dans ledetail desquelles nous nentrerons point attendu que cette observation ne presente rien departiculier pour nous arrester a tout ledetail qui y est contenu. cette maladie nest autre chose quune tumeur enkistee. ces observations ne sont pas rares, cependant nous approuvons la conduitte que lautheur a tenu pour combattre la maladie. nous estimons neammoins que laditte observation nepeut entrer dans les memoires de cette academie.

a paris ce —— dix 8bre Mil sept cent cinquante quatre ——

Coutavoz   Maurain

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Lemie et Loupe